

**FACTEURS FAMILIAUX ET INDIVIDUELS ASSOCIES A LA NON-UTILISATION
DU CONDOM CHEZ LES ADOLESCENTS ET JEUNES CELIBATAIRES SELON
LE SEXE EN COTE**

Auteur : COULIBALY ZIE ADAMA, Etudiant en Démographie / IFORD-Yaoundé II / Cameroun.

E-mail : zieadama40@gmail.com


Résumé détaillé

La prévalence des IST/VIH/SIDA parmi les adolescents et jeunes reste une préoccupation majeure en matière de santé de la reproduction. En effet, le VIH/SIDA constitue une menace grave pour la santé publique en raison de l'existence de nombreux comportements sexuels à risque (rapport sexuel précoce, multipartenariat, non-utilisation du condom). En 2016, en Côte d'Ivoire, 39% des garçons et 64% des filles de 15-24 ans n'ont pas utilisé de condoms au dernier rapport sexuel (EDS-MICS-2016). Dans les études parcourues sur les facteurs explicatifs de la non-utilisation du condom en Côte d'Ivoire l'environnement familial est peu évoqué. De nos jours pourtant, le relâchement du contrôle parental et le recul de l'âge au mariage ont entraîné un développement de la sexualité prémaritale. De ce constat, il nous a semblé nécessaire de porter une attention à la question suivante : « **Quels sont les facteurs familiaux et individuels associés à la non-utilisation de condom chez les adolescents et jeunes célibataires en Côte d'Ivoire ?** »

Pour trouver des réponses à cette question, nous avons parcouru la littérature. Cette dernière nous a permis de cibler les différentes approches utilisées dans les études antérieures sur les comportements sexuels à risque chez les adolescents et jeunes. Il s'agit entre autre de l'approche de socialisation, du contrôle parental, de l'instabilité familiale, du capital social et l'approche globale. S'appuyant sur la synthèse de la littérature ainsi que les éléments du contexte de la Côte d'Ivoire, nous avons formulé l'hypothèse générale suivante : les facteurs familiaux influencent la non-utilisation du condom via les facteurs individuels. Cette influence peut se faire sous l'effet du contexte de résidence et le contrôle des facteurs extrafamiliaux et des médias.

Par la suite, nous avons défini les différents concepts avec leurs indicateurs respectifs. Ensuite, il nous a semblé pertinent d'élaborer un schéma d'analyse calqué sur le schéma conceptuel, mais cette fois-ci avec les indicateurs (variables opérationnelles) à la place des concepts. Le schéma conceptuel de cette étude est inspiré de celui proposé par RWENGE et ces collègues (2020) pour une explication globale du comportement sexuel des adolescents (la figure suivante). C'est l'approche globale qui est adoptée dans cette étude.

Schéma conceptuel d'analyse de la non utilisation du condom chez les adolescents



Au total, nous avons mobilisé 23 variables dont 1 variable dépendante et 22 variables indépendantes. Les données que nous utilisons proviennent de la 5ème enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS5) réalisée en Côte d'Ivoire en 2016. La population cible de notre étude est constituée de l'ensemble des adolescents et jeunes âgés de 15-24 ans non mariés, de sexe masculin et féminin et ayant eu au moins un rapport sexuel. Ainsi, la taille de notre échantillon est de 1457 pour filles sexuellement actives et 851 garçons sexuellement actifs. Cet écart entre les effectifs est dû à la méthodologie de collecte utilisée lors de la MICS-5. À l'issue de cette évaluation, il s'est avéré que le taux de non-réponse des variables est inférieur à 10%. Autrement, la qualité de nos données est acceptable. Dans cette étude, nous avons comme variable à expliquer la non-utilisation du condom au dernier rapport sexuel. Le travail concerne les jeunes célibataires âgés de 15-24 ans ayant eu au moins un rapport sexuel dans les douze (12) derniers mois. En effet, la non-utilisation du condom expose les adolescents et jeunes au

risque de contracter et transmettre le SIDA. Elle rend compte du risque probable de l'adolescent ou du jeune à l'infection du SIDA.

L'étude comportait deux (2) volets d'analyse. Le premier volet, à caractère descriptif, est consacré à l'évaluation de l'association entre la non-utilisation du condom au dernier rapport sexuel et chacune des variables explicatives mobilisées dans cette étude. Aussi dans ce volet, le profil des adolescents et jeunes n'ayant pas utilisé le condom au dernier rapport sexuel est dégagé. Le second volet, à visé explicatif, a pour but de mettre en exergue les facteurs explicatifs associés à la non-utilisation du préservatif chez les jeunes selon le sexe, au moyen de la régression logistique binomiale.

Il ressort des résultats de l'analyse bivariée que toutes variables du contexte de résidence, du cadre extrafamilial, sont associées à la non-utilisation du condom aussi bien chez les filles que chez les garçons. Au niveau cadre familial, les variables associées à la non-utilisation du condom chez les jeunes des deux sexes sont la connaissance approfondie du SIDA par les membres du ménage, le niveau de vie du ménage, l'instruction et l'ethnie du chef de ménage. La qualité de la relation parents-enfants n'est significative que chez les jeunes filles, pareil pour la liberté d'expression chez les garçons.

L'AFCM a permis de dégager le groupe des jeunes n'utilisant pas le condom. Chez les jeunes hommes, ce groupe est constitué des jeunes résidant en milieu rural, dans les ménages pauvres et moyens, dirigés par un individu non instruit. Ces jeunes, appartenant à la religion musulmane, n'ont généralement pas fréquenté et n'ont aucune connaissance approfondie du Sida. Chez les filles, le groupe cible est constitué des filles résidant dans les régions du Nord et de l'Ouest en milieu rural. Elles viennent des ménages pauvres et moyens, des familles monoparentales ou des ménages de type polygame et des ménages dirigés par un individu non instruit qui a de forte chance d'être une femme. Ces jeunes filles, ayant connu très tôt leurs premiers rapports sexuels, n'ont généralement pas fréquenté, sont non exposés aux médias et appartiennent à la religion traditionnelle.

Il ressort des résultats de l'analyse explicative que les facteurs communs de la non-utilisation du condom chez les jeunes sont le niveau de vie du ménage, l'appartenance religieuse et le niveau d'instruction. Les facteurs spécifiques aux jeunes hommes sont la structure familiale et la cohabitation avec les parents. Chez les jeunes filles, les facteurs spécifiques sont le multipartenariat et le type de relation. Par conséquent, des efforts de sensibilisation des jeunes

en matière de sexualité doivent être accentués pour éviter de nouvelles infections au VIH. Ladite sensibilisation doit considérer les parents tout en les encourageant à communiquer avec les enfants sur la sexualité.